

คาถา 5ย กันสุนัขกัด

ย1

อย่าแหย่
สุนัขให้โมโห



ย2

อย่าเหยียบ
หาง หัว ตัว ขา หรือ
ทำให้สุนัขตกใจ



ย3

อย่าแหยก
สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



ย4

อย่าหยิบ
จานข้าวหรือเคลื่อนที่
ย้ายอาหารขณะสุนัข
กำลังกินอาหาร



ย5

อย่ายุ่ง
หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน

ต้องทำดังนี้

1.ล้างแผลให้สะอาด
ด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง
ให้ถึงก้นแผลล้างสบู่ออกให้
หมดเช็ดแผลให้แห้ง
ใส่ยา รักษาแผลสด




2.จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อ
สืบหาเจ้าของ

กักหมา - แมว

ไว้ดูอาการ 10 วัน สอบถาม
ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า



3.ไปหาหมอหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับ
การป้องกันที่ถูกต้อง



สุนัขกัด ต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา
หาหมอ ฉีควัคซีนต่อจนครบชุด

โรคพิษสุนัขบ้า

“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด
ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”



ป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง
จากการถูกสุนัขกัด

3 ให้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้เมืองไทยปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ให้ความรู้
ให้วัคซีน



องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาต

หมายเลขโทรศัพท์ 054-542886-101

โทรสาร 054-542886-110

<http://www.rongkat.go.th/>

rongkat1@gmail.com


โรค

พิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรมีส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต โดยพบมากที่สุดที่สุนัข และรองลงมาคือแมว

การติดต่อ



คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อกัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมวจะพบว่า มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งแต่อ่อนแสดงอาการ 1-7

อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือนแต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำปวดท้องน้อยและขา กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือนและจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึมโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิดไม่อยู่นิ่งกัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการค้างห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำ ห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย้อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด



คำแนะนำ

สำหรับคนเลี้ยงสุนัข >>>



1.

นำสุนัขไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)

2.

ไม่ปล่อยสุนัข ไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัข ออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง



3.

ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิด ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



ที่มา : กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อ

หยุดปล่อยหมา

หยุดปัญหาหมาจรจัด



“โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้” หากมีอาการแล้ว ตายทุกราย