



## จดหมายข่าว

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาสด

ฉบับ ที่ ๑๐๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

email : [rongkat1@gmail.com](mailto:rongkat1@gmail.com) <http://www.rongkat.go.th/>

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุ่งรักษาและต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชา **รัชกาลที่ ๙** "...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นดีได้ทั้งหมด การทำให้ บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ ทุกคนเป็นคนดี หาก แต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

## โรคไข้นุดับ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Streptococcus suis* (สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส)

### กินหมูดิบ ระวังเสี่ยงติดเชื้อไข้นุดับ



#### เกิดจาก

ร่างกายมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสหมู กินเนื้อหรือเลือกหมูดิบที่มีเชื้อ "สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส" ปนเปื้อน

#### อาการ

มีไข้ ไข้หวัด อาเจียน ปวดศีรษะ ประสาทหูอักเสบจนหูตึง หากอาการรุนแรง อาจเสียชีวิตได้

#### ป้องกันได้โดย

- ไม่ทานหมูสุก ๆ ดิบ ๆ หมูป่วย หรือหมูตายจากโรค
- ผู้ที่มีบาดแผลที่ต้องทำงานกับหมูโดยตรง ควรปิดแผลและสวมถุงมือ
- เลือกเนื้อหมูที่ได้มาตรฐาน ไม่มีกลิ่นคาว สดใส และสะอาด
- ประงให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 10 นาที หรือจนกว่าเนื้อหมูไม่มีสีแดง

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

**ANTI-FAKE NEWS CENTER ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย**

Copyright © 2022, Anti-Fake News Center, All rights reserved



- สาเหตุและการติดต่อ: เชื้อแบคทีเรีย S. suis อยู่ในทางเดินหายใจและเลือดของหมู ติดต่อกันโดย:
  - การกิน: รับประทานเนื้อหมู เลือดดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
  - การสัมผัส: สัมผัสเลือดหรือเนื้อหมูที่มีเชื้อผ่านบาดแผล รอยถลอก หรือเย็บบุตา
- อาการสำคัญ (มักเกิดขึ้นภายใน 1-3 วัน):
  - ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตัว
  - ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะ อาเจียน คอแข็ง
  - หูอื้อ หูดับเฉียบพลัน หรือหูหนวกถาวร
  - มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง
  - หากเชื้อรุนแรงอาจทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิต
- การป้องกัน:
  - NO! งดกินหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เด็ดขาด
  - YES! ประงสุกสม่ำเสมอด้วยความร้อนสูงกว่า  $70^{\circ}\text{C}$
  - เลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้
  - แยกอุปกรณ์ครัวสำหรับเนื้อดิบและสุก
  - สวมถุงมือและรองเท้าบูทขณะชำแหละหรือสัมผัสหมู และล้างมือทุกครั้ง
- การรักษา: เมื่อมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที แพทย์จะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ หากท่านมีอาการไข้สูงร่วมกับหูอื้อหลังจากกินหมูดิบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาสด

เลขที่ 159 หมู่ 4 ต.ร่องกาสด อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทร.054-542886 ,054-625267 แฟกซ์ -102 แจ้งเหตุเตือนสาธารณภัย 054-626199